

4. Для оценки степени проявления дизартрии Чаще используется при неврологических нарушениях

Dysarthria Assessment (функциональные шкалы для оценки дизартрии) — это инструменты, которые используются в клинической работе логопеда для диагностики и оценки выраженности речевых нарушений при дизартрии. Такие шкалы объединяют клиническое и логопедическое исследование, позволяют получить комплексную оценку расстройств и объективно оценить динамику восстановления речи.

Виды

Некоторые виды функциональных шкал для оценки дизартрии:

- **Шкала оценки дизартрии.** Включает 19 пунктов, которые оценивают состояние черепных нервов, участвующих в иннервации мышц речевого аппарата, а также голос, темп, ритм, интонационно-мелодическую окраску речи и звукопроизношение.

Каждый пункт оценивается по 5-балльной системе от 0 до 4 баллов: 0 — нарушений нет, 1 — лёгкие нарушения, 2 — умеренные нарушения, 3 — тяжёлые нарушения, 4 — полное выпадение функции.

- **Шкала оценки вида дизартрии.** Состоит из 4 подшкал, в которых описываются универсальные критерии оценки неврологических и логопедических критериев постановки диагноза. Например, оцениваются тонус мышц артикуляционного аппарата, сила мышц, рефлексы, объём артикуляционных движений, точность движений языка.

Методика проведения

Оценка дизартрии с помощью функциональных шкал проводится медицинским логопедом. Некоторые особенности методики:

- **Учёт особенностей пациента.** Например, если у пациента проблемы с коммуникацией (интубация, ИВЛ), он находится без сознания, если у больного выраженный когнитивный дефицит, то он по шкале не оценивается.
- **Изучение функций.** Например, больного просят повторить за логопедом речевой материал различной степени сложности (фразы с различной интонацией, скороговорки).

Интерпретация результатов

Шкала может использоваться не только как критерий применения клинических стандартов, но и для разработки дифференцированных и индивидуализированных программ лечения и реабилитации больных с дизартрией

Бланк ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИЗАРТРИИ (ВЗРОСЛЫЕ)

Бланк подходит для:

- БАС
- инсульт
- ЧМТ
- болезни Паркинсона
- рассеянного склероза
- ДЦП (взрослые)

ФИО пациента: _____

Возраст: _____

Дата обследования: _____

Диагноз / неврологический статус: _____

Специалист: _____

Шкала оценки

0 — норма | 1 — лёгкое | 2 — умеренное | 3 — выраженное нарушение

1. ДЫХАНИЕ

Параметр	0	1	2	3
Тип дыхания (речевое)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Дыхательная поддержка речи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Координация дыхание–речь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. ФОНАЦИЯ (ГОЛОС)

Параметр	0	1	2	3
Сила голоса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Устойчивость фонации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Качество голоса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. АРТИКУЛЯЦИЯ

Параметр	0	1	2	3
Подвижность губ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подвижность языка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Чёткость артикуляции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. РЕЗОНАНС

Параметр	0	1	2	3
Назализация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль мягкого нёба	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. ПРОСОДИЯ

Параметр	0	1	2	3
Темп речи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ритм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Параметр	0	1	2	3
Интонационная выразительность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ

Общая разборчивость речи:

- 0 — полностью разборчива
- 1 — слегка снижена
- 2 — значительно снижена
- 3 — речь труднопонимаема / неразборчива

Итоговое заключение

Степень дизартрии:

- лёгкая
- умеренная
- выраженная
- анартрия

Ведущие нарушения:

- дыхание
- фонация
- артикуляция
- просодия
- резонанс

Рекомендации

Подпись специалиста: _____

Оценка пищеводного голоса