

## ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ

Пациенты  $\geq 60$  лет – скрининг по шкале «Возраст не помеха»

|    | Вопрос                                                                                                              | Ответ  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Похудели ли Вы на 5 кг или больше за последние 6 месяцев? (Вес)                                                     | Да/нет |
| 2. | Испытываете ли Вы какие – либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения слуха или зрения?                    | Да/нет |
| 3. | Были ли у Вас в течение последнего года травмы, связанные с падением?                                               | Да/нет |
| 4. | Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным на протяжении последних недель? (Настроение)          | Да/нет |
| 5. | Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать?                             | Да/нет |
| 6. | Страдаете ли Вы недержанием мочи?                                                                                   | Да/нет |
| 7. | Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или на улице? (Ходьба до 100 м или подъем на 1 лестничный пролет) | Да/нет |

| «Хрупкие» пациенты                                                                              | «Прехрупкие» пациенты                       | «Крепкие» пациенты      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| $\geq 3$ -х положительных ответов                                                               | 1-2 положительных ответа                    | 0 положительных ответов |
| Консультация врача-гериатра, проведение КГО, составление индивидуального плана ведения пациента | Целесообразна консультация врача - гериатра |                         |

Наблюдение участкового терапевта, выполнение индивидуального ведения пациента с ССА